


Некачественная подготовка кишечника перед колоноскопией снижает вероятность обнаружения новообразований и точность постановки диагноза¹³

Эзиклен® – однократный препарат с удобным приёмом и высоким качеством очищения кишечника^{14,15}

Комфортная подготовка к колоноскопии¹

- 1 литр раствора осмотического средства¹
- Мерный стакан для приготовления раствора в упаковке¹
- Возможно принимать обе дозы препарата утром в день исследования, если оно назначено на 14:00 и позже¹



www.eziclen.ru

Эффективное очищение каждого сегмента толстой кишки^{14,15}

Благоприятный профиль безопасности, в т.ч. у пациентов старше 65 лет^{14,15}

Схема приема препарата в режиме дробного применения в случае, если процедура назначена, например, на 10 часов утра¹⁴

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОЛОНОСКОПИИ ПРЕПАРАТОМ ЭЗИКЛЕН®

Схема **ДВУХЭТАПНОГО** приема препарата, если колоноскопия назначена на ПЕРВУЮ половину дня (до 13:00)*

Начало исследования	Прием ПЕРВОЙ дозы — день НАКАНУНЕ процедуры		Прием ВТОРОЙ дозы — В ДЕНЬ процедуры	
	РАСТВОР препарата выпить медленно, в течение 30–60 минут	Разрешенная жидкость, 1 литр	РАСТВОР препарата выпить медленно, в течение 30–60 минут	Разрешенная жидкость, 1 литр
08:00			03:00 – 04:00	04:00 – 05:00
09:00	16:00 – 17:00	17:00 – 18:00	04:00 – 05:00	05:00 – 06:00
10:00			05:00 – 06:00	06:00 – 07:00
11:00			06:00 – 07:00	07:00 – 08:00
12:00	19:00 – 20:00	20:00 – 21:00	07:00 – 08:00	08:00 – 09:00
13:00			08:00 – 09:00	09:00 – 10:00

В таблице указана рекомендуемая схема приема препарата. Подходящая схема может быть определена и скорректирована врачом.

Схема **ОДНОЭТАПНОГО** приема препарата, если колоноскопия назначена на ВТОРУЮ половину дня (с 14:00 и далее)*

Начало исследования	Прием ПЕРВОЙ дозы — утром В ДЕНЬ процедуры		Прием ВТОРОЙ дозы — В ДЕНЬ процедуры	
	РАСТВОР препарата выпить медленно, в течение 30–60 минут	Разрешенная жидкость, 1 литр	РАСТВОР препарата выпить медленно, в течение 30–60 минут	Разрешенная жидкость, 1 литр
14:00	07:00 – 08:00	08:00 – 09:00	09:00 – 10:00	10:00 – 11:00
15:00	08:00 – 09:00	09:00 – 10:00	10:00 – 11:00	11:00 – 12:00
16:00	09:00 – 10:00	10:00 – 11:00	11:00 – 12:00	12:00 – 13:00
17:00	10:00 – 11:00	11:00 – 12:00	12:00 – 13:00	13:00 – 14:00
18:00	11:00 – 12:00	12:00 – 13:00	13:00 – 14:00	14:00 – 15:00
19:00	12:00 – 13:00	13:00 – 14:00	14:00 – 15:00	15:00 – 16:00

В таблице указана рекомендуемая схема приема препарата. Подходящая схема может быть определена и скорректирована врачом.

Применение препарата Метеоспазмил® может облегчить процедуру колоноскопии

за счет уменьшения спазма кишки, избыточного газообразования и пеннистого секрета, а также способствует уменьшению вздутия, боли в животе — проявлений реактивного кишечного дискомфорта после процедуры¹⁶

Схема применения препарата Метеоспазмил® при подготовке к колоноскопии¹⁷:

- По 1 капсуле 2–3 раза в день накануне исследования и 1 капсула утром в день исследования

В день накануне исследования:

- Кратность приема (2 или 3 раза) определяется врачом индивидуально в зависимости от степени выраженности симптомов
- Первые 1–2 капсулы целесообразно принять до начала приема слабительного препарата для очищения кишечника¹⁴
- Последнюю капсулу целесообразно принять после выпивания всей порции слабительного

В день проведения исследования:

- 1 капсула однократно утром¹⁷ (в случае утреннего приема слабительного — после выпивания всей порции¹⁴; в случае проведения колоноскопии под наркозом — не позднее 2х часов до начала исследования¹⁴)

* При расчете времени приема учитывается время между дозами от 10 до 12 часов, а также желаемое время между окончанием подготовки и колоноскопией — 3 часа. Режимы, схемы приема и разведения

препарата указаны в инструкции по медицинскому применению препарата Эзиклен®.

Краткий листок-вкладыш лекарственного препарата Эзиклен®, 3,130 г + 3,276 г + 17,510 г, концентрат для приготовления раствора для приема внутрь. Препарат Эзиклен® содержит калия сульфат + магния сульфат + натрия сульфат. **Фармакологическая группа:** осмотическое слабительное средство. **Показания к применению:** для очищения толстой кишки у взрослых пациентов (в возрасте от 18 лет) при подготовке к эндоскопическому и радиологическому исследованию толстой кишки или к хирургическим вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке. **Способ действия:** осмотический эффект неабсорбируемых сульфатов и прием внутрь значительного объема воды вызывает задержку воды в кишечнике, что обеспечивает слабительное действие, вызывая обильную воднистую диарею, и приводит к очищению кишечника. **Не применять, если у Вас:** аллергия на калия сульфат, магния сульфат, натрия сульфат или любые другие компоненты препарата; желудочно-кишечная обструкция или подозрение на желудочно-кишечную обструкцию или стеноз; известная или предполагаемая перфорация стенки кишечника (перфорация кишечника); нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе, гастропарез, гастростаз); кишечная непроходимость (илеус); токсический колит или токсический мегаколон; тошнота и рвота; серьезные ухудшения здоровья, такие как дегидратация тяжелой степени; застойная сердечная недостаточность; асцит; тяжелая почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/1,73м²); активная фаза воспалительных заболеваний кишечника (таких, как болезнь Крона, язвенный колит); острое заболевание брюшной полости, требующее хирургического вмешательства (например, острый аппендицит); беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет. **Беременность и грудное вскармливание:** Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Препарат Эзиклен® не рекомендуется принимать во время беременности. Следует прекратить грудное вскармливание на период приема препарата Эзиклен® и вплоть до 48 часов после приема второй дозы. **Рекомендуемая доза:** для надлежащего очищения кишечника требуется прием двух флаконов препарата Эзиклен®, Перед приемом содержимое каждого флакона необходимо развести водой. Вы должны выпить полученный разведенный раствор и еще две чашки, наполненные до метки водой или разрешенной прозрачной жидкостью (т.е. приблизительно 1 л), в течение следующих двух часов. Полная информация о разделах «Режим применения» и «Схема разведения и применения» содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Эзиклен®. **Возможные нежелательные реакции:** очень часто — вздутие живота; боль в животе; тошнота; рвота; общий дискомфорт. Хранение: хранить при температуре не выше 25°C. Срок годности: не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной упаковке (пачке) после слов «годен до:». **Держатель регистрационного удостоверения:** ИПСЕН КОНСЬОМЕР ХЕЛСКЕА, Франция. **Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Союза:** ООО «МАЙОЛИ ФАРМА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23. Тел.: +7 (495) 664-83-03. E-mail: vorpros@mayoly.com. Полная информация содержится в листке-вкладыше лекарственного препарата Эзиклен®.

1. Электронный ресурс: <https://gcoliar.fhoday/data/actsheets/populations/643-russian-federation/fact-sheets.pdf>. Дата доступа 23.12.20. 2. Электронный ресурс: <https://medvestnik.ru/content/interviews/kolorektalny-rak-vysokaya-lelalnosti-polnaya-izlechiavost.html>. Дата доступа 23.12.2020. 3. Александров В.Б. Конспектальный рас: Руководство по гастроэнтерологии // Под ред. Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. М., 2010. С. 418–432. 4. Электронный ресурс: <https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinaldisorders/tumors-of-the-gastrointestinal-tract/colorectal-cancer>. Дата доступа 23.12.2020. 5. John K. Triantafyllidis, Constantine Vagianos, George Malignaris Colonoscopy in Colorectal Cancer Screening: Current Aspects // Indian J Surg Oncol. September 2015; 6(3):237–250. 6. Amersi F, Augustin M, Ko CY. Colorectal cancer: epidemiology, risk factors, and health services. Clin Colon Rectal Surg. 2005;18(3):133–140. doi:10.1055/s-2005-916274. Электронный ресурс: <https://www.cancer.org/cancer/colorectal-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html>. Дата доступа 23.12.2020. 7. Riaz R, Masood N, Benish A. Red flag symptoms: detailed account of clinicopathological features in young-onset colorectal cancer. Intest Res. 2017;15(2):203–207. doi:10.5217/ir.2017.15.2.203. 8. Мисникова И.В. Сахарный диабет и рак. РМЖ. 2016;20:1346–1350. 9. Guérin A, Mody R, Fok B, Lasch K.L., Zhou Z., Wu E.Q., Zhou W., Talley N.J. Risk of developing colorectal cancer and benign colorectal neoplasms in patients with chronic constipation Aliment Pharmacol Ther. 2014. 10. Электронный ресурс: <https://www.cancer.org/cancer/colorectal-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html>. Дата доступа 23.12.2020. 11. Julia Hippisley-Cox, Carol Coupland Identifying patients with suspected colorectal cancer in primary care: derivation and validation of an algorithm. British Journal of General Practice. 2012; 62 (694): e29–e37. DOI: 10.3399/bjgp12616346. 12. Электронный ресурс: <http://ncj2030.rustatintellivipubfairsarkov>. Дата доступа 23.12.2020. 13. Kastenberg B, Bertiger G, Brogadir S. Bowel preparation quality scales for colonoscopy. World J Gastroenterol. 2018;24(26):2833–2843. DOI:10.3748/wjg.v24.i26.2833. 14. ОХПЭ Эзиклен®, концентрат для приготовления раствора для приема внутрь от 05.11.2024. 15. Дулагас К, Ренк и др. Рандомизированное клиническое исследование «Сравнение малообъемного перорального раствора сульфатов со стандартным 4-литровым раствором макрогола для подготовки к колоноскопии» // Gastrointestinal Endoscopy. Vol. 72, № 2. 2010. 16. Ди Пальма Дж.А. и др. Рандомизированное клиническое исследование безопасности и эффективности нового малообъемного перорального раствора сульфата для очищения кишечника перед колоноскопией // Am J Gastroenterol. 2009; 104:2275–84. 16. Кашин С.В., Завялова Д.В., Сиднева А.В. Влияние Метеоспазмилла на эффективность и переносимость подготовки к колоноскопии. Докладная гастроэнтерология. 2023;12(2):34–44. 17. ИМП Метеоспазмил®, капсулы от 05.11.2020.